
LYL

LE GUIDE LOVE YOUR LIFE

CARNOSINA

Dalla fisiologia muscolare alla glicazione e all'invecchiamento

Biochimica, metabolismo, protezione cellulare e strategie di supplementazione



CARNOSINA

Dalla fisiologia muscolare alla glicazione e all'invecchiamento

Biochimica, metabolismo, protezione cellulare e strategie di supplementazione

Giovanni Chetta

Le Guide Love Your Life edizione 2026

Sommario

Guida alla lettura 4
Come interpretare il livello delle evidenze 4
Sommario 5
1. Identità chimica e caratteristiche della carnosina 6
2. Sintesi, metabolismo e carnosinasi 7
3. Distribuzione nei tessuti 8
4. Muscolo, pH ed esercizio 9
5. Antiossidazione, carbonili, AGE e ALE 11
6. Mitocondri, calcio e omeostasi cellulare 12
7. Infiammazione e vie di risposta allo stress 13
8. Metabolismo glucidico e diabete 14
9. Rene e nefropatia diabetica 15
10. Sistema nervoso, cognizione e invecchiamento cerebrale 16
11. Apparato cardiovascolare 17
12. Occhio, mucosa gastrica e derivati clinicamente distinti 18
13. Alimentazione e stato di carnosina 19
14. Supplementazione con carnosina 20
15. β-alanina: strategia per aumentare la carnosina muscolare 22
16. Anserina, omocarnosina e altri dipeptidi istidinici 23
17. Sinergie e associazioni 24
18. Carnosina nella medicina del terreno e integrata 25
Una lettura per obiettivi 25
19. Sicurezza, tollerabilità e interazioni 26
20. Cosa sappiamo davvero: limiti delle evidenze 27
21. Schema pratico di orientamento 28
Conclusioni 29
Glossario 30
Bibliografia 32
L'Autore 34
Copyright e note legali 34

Guida alla lettura

Questa guida considera la carnosina come una molecola endogena con ruoli distinti nei diversi compartimenti biologici. Il dato più solido riguarda il muscolo scheletrico, nel quale la carnosina partecipa al tamponamento intracellulare e può essere aumentata mediante supplementazione cronica di β-alanina. Altri ambiti, come glicazione, stress carbonilico, metabolismo glucidico, neuroprotezione e healthy aging, sono biologicamente plausibili e sostenuti in misura variabile da studi preclinici e clinici, ma non devono essere presentati come equivalenti per grado di evidenza.

Nel testo viene quindi mantenuta una distinzione esplicita fra meccanismo biochimico, dato sperimentale, segnale clinico e indicazione consolidata. Le dosi citate descrivono protocolli studiati o intervalli di impiego nutrizionale e non costituiscono una prescrizione individuale. In presenza di patologie, gravidanza, terapia farmacologica o condizioni cliniche complesse, la supplementazione deve essere valutata nel contesto medico.

Sigle e acronimi vengono esplicitati alla prima occorrenza in ciascun capitolo quando compaiono. Il Glossario, collocato alla fine del volume, raccoglie i termini biochimici e clinici principali per facilitare la consultazione trasversale.

L'impostazione è coerente con la medicina del terreno e con la medicina integrata: la carnosina non viene trattata come una sostanza isolata, ma nel rapporto con alimentazione, attività fisica, massa muscolare, controllo glicemico, stress ossidativo, sonno, infiammazione, funzione mitocondriale e contesto clinico individuale.

Come interpretare il livello delle evidenze

Livello	Significato pratico
Consolidato	Meccanismo o effetto sostenuto da fisiologia umana e da un corpo coerente di studi.
Probabile	Segnale clinico favorevole con limiti di numerosità, durata o eterogeneità.
Preclinico	Dati cellulari o animali utili per il meccanismo, non sufficienti per una conclusione clinica.
Ipotesi	Associazione plausibile che richiede conferme sperimentali e cliniche.

Sommario

1. Identità chimica e caratteristiche della carnosina

2. Sintesi, metabolismo e carnosinasi

3. Distribuzione nei tessuti

4. Muscolo, pH ed esercizio

5. Antiossidazione, carbonili, AGE e ALE

6. Mitocondri, calcio e omeostasi cellulare

7. Infiammazione e vie di risposta allo stress

8. Metabolismo glucidico e diabete

9. Rene e nefropatia diabetica

10. Sistema nervoso, cognizione e invecchiamento cerebrale

11. Apparato cardiovascolare

12. Occhio, mucosa gastrica e derivati clinicamente distinti

13. Alimentazione e stato di carnosina

14. Supplementazione con carnosina

15. β-alanina: strategia per aumentare la carnosina muscolare

16. Anserina, omocarnosina e altri dipeptidi istidinici

17. Sinergie e associazioni

18. Carnosina nella medicina del terreno e integrata

19. Sicurezza, tollerabilità e interazioni

20. Cosa sappiamo davvero: limiti delle evidenze

21. Schema pratico di orientamento

Conclusioni

Glossario

Bibliografia

L’Autore

1. Identità chimica e caratteristiche della carnosina

La carnosina è un dipeptide formato da β-alanina e L-istidina. La presenza dell'anello imidazolico dell'istidina conferisce alla molecola proprietà acido-base particolarmente utili nel citoplasma delle cellule muscolari, dove può accettare protoni e contribuire al tamponamento delle variazioni di pH. Il legame peptidico coinvolge la β-alanina, un β-amminoacido, e questo distingue la carnosina dai normali peptidi costruiti esclusivamente con α-amminoacidi.

La molecola è idrosolubile e si concentra soprattutto nel muscolo scheletrico. Non è una vitamina e non rappresenta un amminoacido essenziale: l'organismo può sintetizzarla a partire dai suoi precursori. La disponibilità di β-alanina è tuttavia generalmente considerata il principale fattore limitante della sintesi muscolare, mentre l'istidina è normalmente presente in quantità sufficienti.

La carnosina non deve essere confusa con la carnitina. Le due molecole hanno struttura e funzioni differenti: la carnitina è coinvolta soprattutto nel trasporto degli acidi grassi a lunga catena verso la matrice mitocondriale, mentre la carnosina appartiene ai dipeptidi contenenti istidina e svolge funzioni di buffering, regolazione chimica e protezione dalle specie reattive.

Caratteristica	Carnosina
Struttura	β-alanil-L-istidina
Classe	Dipeptide contenente istidina
Tessuto principale	Muscolo scheletrico
Funzione meglio documentata	Tamponamento intracellulare durante esercizio ad alta intensità
Precursore limitante	β-alanina
Destino orale	Parzialmente idrolizzata dalle carnosinasi; biodisponibilità sistemica diversa da quella muscolare


2. Sintesi, metabolismo e carnosinasi

La sintesi della carnosina avviene per azione della carnosina sintasi 1 (CARNS1), enzima citosolico che utilizza β-alanina, L-istidina e adenosina trifosfato (ATP) per formare il dipeptide. La capacità di accumulo varia fra tessuti e individui e dipende da disponibilità dei precursori, fibre muscolari, sesso, dieta, allenamento e fattori genetici.

La degradazione è affidata a dipeptidasi note come carnosinasi. La carnosinasi 1 (CN1), codificata dal gene CNDP1, è una dipeptidasi secretoria presente soprattutto nel plasma; la carnosinasi 2 (CN2), associata al gene CNDP2, è una dipeptidasi citosolica con spettro di substrati più ampio. La forte attività sierica di CN1 contribuisce a spiegare perché la carnosina ingerita non determini necessariamente un'esposizione plasmatica prolungata.

È un passaggio centrale nell'interpretazione degli studi. Dopo supplementazione orale, un effetto può dipendere dalla carnosina intatta, dai prodotti della sua degradazione, da un aumento locale transitorio o dall'interazione con altri dipeptidi. Le concentrazioni efficaci in vitro non possono quindi essere trasferite direttamente all'organismo umano.

Sintesi e destino della carnosina



CN1 è soprattutto extracellulare/sierica; CN2 è una dipeptidasi citosolica con diversa specificità.

Sintesi e metabolismo della carnosina: la β-alanina è il precursore generalmente limitante, mentre le carnosinasi modulano la persistenza extracellulare del dipeptide.

3. Distribuzione nei tessuti

Il muscolo scheletrico rappresenta il principale deposito di carnosina nell'uomo. Le concentrazioni sono influenzate dal tipo di fibra: le fibre rapide e glicolitiche tendono ad avere contenuti superiori rispetto alle fibre lente e ossidative, coerentemente con una maggiore necessità di tamponare carichi acidi elevati durante contrazioni intense.

La carnosina è presente anche nel sistema nervoso, nel cuore e in altri tessuti eccitabili, sebbene a concentrazioni inferiori rispetto al muscolo. Nel sistema nervoso coesiste con altri dipeptidi istidinici, fra cui l'omocarnosina, e può partecipare alla regolazione redox e alla neutralizzazione di specie carboniliche reattive.

Il contenuto tissutale non è statico. Alimentazione, età, attività fisica e supplementazione modificano il pool disponibile. Le differenze tra soggetti onnivori e vegetariani/vegani sono particolarmente rilevanti nel muscolo, poiché i dipeptidi istidinici sono tipici degli alimenti animali.

Compartimento	Rilevanza fisiologica
Muscolo scheletrico	Massimo deposito; buffering e gestione chimica dello stress metabolico.
Sistema nervoso	Ruoli proposti in neuroprotezione, redox e metabolismo dei carbonili; evidenze cliniche ancora limitate.
Cuore	Possibile protezione da stress ossidativo e ischemia-riperfusione, soprattutto da dati sperimentali.
Plasma	Concentrazioni basse e transitorie per attività della carnosinasi 1.


4. Muscolo, pH ed esercizio

Durante esercizi ad alta intensità, l'aumento del turnover di adenosina trifosfato e l'elevato flusso glicolitico si associano ad accumulo di protoni (H^+) e a riduzione del pH intracellulare. La carnosina contribuisce alla capacità tampone del muscolo grazie al gruppo imidazolico dell'istidina, il cui pKa è compatibile con l'intervallo fisiologico del pH muscolare.


La supplementazione cronica di β-alanina aumenta in modo affidabile il contenuto di carnosina muscolare. Le revisioni disponibili indicano che il vantaggio prestativo è più probabile negli sforzi intensi di durata intermedia, nei quali l'acidosi contribuisce alla fatica, mentre gli effetti sono meno prevedibili negli sforzi molto brevi, puramente massimali, o nelle prestazioni aerobiche prolungate.

L'incremento è progressivo e dipende soprattutto dalla dose cumulativa e dalla durata dell'esposizione. Le strategie pratiche usano in genere dosi frazionate per ridurre la parestesia; le formulazioni a rilascio prolungato possono migliorare la tollerabilità. Dopo la sospensione, il contenuto muscolare di carnosina non torna immediatamente al basale: il washout richiede settimane e varia fra soggetti. Per questo il timing della singola dose rispetto all'allenamento conta molto meno della continuità del protocollo.

L'aumento della carnosina non sostituisce l'allenamento. Il risultato dipende dall'interazione fra adattamenti neuromuscolari, disponibilità energetica, capacità ossidativa, tecnica, recupero, stato nutrizionale e contenuto iniziale di carnosina. In soggetti anziani, i dati sulla β-alanina sono promettenti per alcuni esiti di capacità funzionale, ma restano meno estesi rispetto alla popolazione giovane e sportiva.



Ruolo della carnosina nel tamponamento degli H^+ nel muscolo. La β-alanina aumenta la disponibilità del precursore e, nell'arco di settimane, il contenuto muscolare di carnosina.




Anatomia funzionale del muscolo scheletrico: la carnosina è concentrata nel compartimento intracellulare delle fibre, dove contribuisce al buffering degli H^+ e si inserisce in un ambiente in cui flussi di Ca^{2+}, ATP e funzione mitocondriale regolano la contrazione.

5. Antiossidazione, carbonili, AGE e ALE

Definire la carnosina soltanto come “antiossidante” è riduttivo. Una delle sue caratteristiche più interessanti è la capacità di reagire con specie carboniliche reattive generate dall’ossidazione di zuccheri e lipidi. Queste specie possono modificare proteine, lipidi e acidi nucleici e favorire la formazione di prodotti finali di glicazione avanzata (AGE, advanced glycation end-products) e prodotti finali di lipossidazione avanzata (ALE, advanced lipoxidation end-products).

Fra le specie carboniliche più studiate figurano metilgliossale, acroleina e 4-idrossinonenale (4-HNE). La carnosina può formare addotti relativamente stabili con alcuni di questi composti e ridurne la reattività verso le macromolecole biologiche. Il fenomeno è documentato soprattutto in sistemi sperimentali e offre una base razionale per studiare la carnosina nel diabete, nell’invecchiamento e nelle condizioni caratterizzate da stress carbonilico.

La rilevanza clinica dipende però dalla farmacocinetica. La presenza di carnosinasi nel plasma limita la persistenza della carnosina intatta, per cui l’efficacia osservata in vitro non può essere tradotta automaticamente in un effetto sistemico dopo una normale dose orale.



La carnosina può intercettare alcune specie carboniliche reattive e ridurre la formazione di addotti associati a glicazione e lipossidazione. Il meccanismo è solido sul piano biochimico, mentre la dimensione clinica è ancora oggetto di ricerca.

6. Mitocondri, calcio e omeostasi cellulare

La carnosina è stata studiata in relazione alla funzione mitocondriale, alla produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS, reactive oxygen species) e alla regolazione del calcio intracellulare. In modelli sperimentali può limitare alcune conseguenze dello stress ossidativo e della perossidazione lipidica, proteggendo membrane e proteine funzionali.

Nel muscolo, la carnosina può influire anche sulla sensibilità dell'apparato contrattile al calcio e sulla gestione locale degli ioni. Questi effetti sono plausibili come parte del vantaggio funzionale associato a concentrazioni muscolari più elevate, ma la quota specifica dovuta alla regolazione del calcio è più difficile da separare dal contributo del buffering.

In chiave di medicina del terreno, il punto importante è evitare una lettura monocausale. La qualità mitocondriale dipende da esercizio, disponibilità di substrati, stato redox, sonno, ritmi circadiani, composizione corporea e controllo metabolico. La carnosina può inserirsi in questo sistema, ma non sostituisce i determinanti principali dell'adattamento mitocondriale.

7. Infiammazione e vie di risposta allo stress

Numerosi studi sperimentali attribuiscono alla carnosina azioni anti-infiammatorie indirette. Una parte dell'effetto può derivare dalla riduzione dello stress carbonilico e ossidativo, che limita segnali pro-infiammatori secondari al danno molecolare.

È stata inoltre proposta l'attivazione del fattore di trascrizione Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2), che regola numerosi geni della risposta antiossidante e della detossificazione elettrofila. Questa via potrebbe collegare attività anticarbonilica, risposta redox e modulazione dell'infiammazione; nell'uomo, tuttavia, il contributo relativo dei diversi meccanismi non è ancora definito con precisione.

Le osservazioni su citochine e chemochine in piccoli studi con anserina/carnosina sono interessanti, ma non giustificano l'uso della carnosina come trattamento antinfiammatorio indipendente. La lettura corretta è quella di un modulatore biologico potenziale all'interno di un contesto più ampio.

8. Metabolismo glucidico e diabete

La glicemia elevata aumenta la produzione di intermedi reattivi e favorisce glicazione e stress carbonilico; da qui nasce l'interesse per la carnosina nel prediabete e nel diabete mellito di tipo 2. Una meta-analisi recente di studi randomizzati ha riportato riduzioni della glicemia a digiuno e dell'emoglobina glicata (HbA1c) con carnosina o β-alanina. Il numero complessivo dei partecipanti resta però limitato e gli studi differiscono per molecola, dose, durata e caratteristiche della popolazione.

Il segnale clinico è quindi interessante ma non equivale a una terapia antidiabetica validata. Inoltre l'uso congiunto di carnosina e β-alanina nella stessa analisi rende più complesso stabilire quale meccanismo abbia guidato l'effetto: incremento tissutale di carnosina, azione sistemica transitoria, cambiamenti nella capacità di esercizio o altri fattori.

I dati clinici più recenti rendono il quadro un po' più concreto, ma non definitivo. In un trial randomizzato controllato su adulti con prediabete o diabete mellito di tipo 2, 2 g/die di L-carnosina per 14 settimane hanno ridotto la glicemia a 90 e 120 minuti durante il test da carico orale di glucosio e l'area totale sotto la curva glicemica. Nello stesso programma di ricerca, tuttavia, non sono emersi miglioramenti convincenti su funzione endoteliale, rigidità arteriosa, lipidi, pressione o marcatori infiammatori. Il dato suggerisce quindi un possibile effetto sul controllo glicemico che deve essere distinto da un beneficio cardiometabolico generalizzato.

In medicina integrata, il controllo del metabolismo glucidico rimane fondato su alimentazione, esercizio, massa muscolare, riduzione dell'eccesso adiposo, sonno adeguato e terapia farmacologica quando indicata. La carnosina può essere studiata come supporto complementare, non come sostituto di tali interventi.

Aspetto	Stato delle evidenze
Glicemia a digiuno	Segnale favorevole in meta-analisi recenti, ma base di studi ancora piccola.
HbA1c	Possibile riduzione; necessita conferme in trial più grandi e omogenei.
Insulino-resistenza	Meccanismi plausibili; risultati clinici non uniformi.
Complicanze da glicazione	Forte razionale biochimico, evidenza clinica ancora insufficiente per indicazioni definitive.

9. Rene e nefropatia diabetica

Il rene è un ambito particolarmente interessante perché collega carnosina, glicazione e metabolismo della carnosinasi. Il gene CNDP1, che codifica la carnosinasi 1 (CN1), è stato studiato per possibili associazioni con suscettibilità alla nefropatia diabetica. Alcune varianti possono influire sull'attività enzimatica e quindi sulla disponibilità di carnosina.

Nei modelli animali di diabete, la supplementazione con carnosina ha spesso migliorato parametri renali e istologici. Nell'uomo sono disponibili segnali preliminari, ma non esiste ancora una base sufficiente per considerare la carnosina una terapia della nefropatia diabetica.

Un'interpretazione prudente deve inoltre considerare la funzione renale globale, la terapia farmacologica, la pressione arteriosa e il controllo glicemico. Nei pazienti con malattia renale cronica, qualsiasi supplementazione dovrebbe essere valutata individualmente, anche quando la sostanza ha un profilo nutrizionale apparentemente semplice.

10. Sistema nervoso, cognizione e invecchiamento cerebrale

Nel sistema nervoso la carnosina e altri dipeptidi contenenti istidina sono stati studiati per attività antiossidante, anticarbonilica, anti-infiammatoria e per possibili interazioni con aggregazione proteica ed eccitotossicità. La maggior parte di questi meccanismi deriva da modelli sperimentali.

Gli studi clinici sull'anziano hanno spesso utilizzato miscele di anserina e carnosina, tipicamente intorno a 1 g al giorno per circa tre mesi. Alcuni trial hanno osservato una migliore conservazione della memoria episodica verbale e revisioni sistematiche hanno riportato segnali favorevoli su alcuni domini cognitivi. Una meta-analisi più recente, tuttavia, ha giudicato la forza complessiva dell'evidenza bassa, a causa di campioni piccoli, eterogeneità e concentrazione di diversi studi nello stesso gruppo di ricerca.

Il quadro distingue bene la plausibilità biologica dalla certezza clinica. Carnosina e anserina rappresentano un'area di ricerca credibile nell'healthy aging cerebrale, ma non possono essere considerate terapie dimostrate per il declino cognitivo, la malattia di Alzheimer o altre patologie neurodegenerative.

Una revisione sistematica con meta-analisi pubblicata nel 2026 ha confermato l'eterogeneità del settore: nella maggior parte delle misure cognitive i trial non mostrano differenze significative, mentre alcuni segnali favorevoli compaiono soprattutto con combinazioni anserina/carnosina o con altri antiossidanti. La forza complessiva dell'evidenza è stata giudicata bassa; un segnale statistico circoscritto non giustifica quindi una raccomandazione generale per prevenire il declino cognitivo.

Ambito	Interpretazione
Memoria episodica	Segnale favorevole in alcuni studi randomizzati controllati (RCT) con anserina/carnosina.
Cognizione globale	Risultati eterogenei; meta-analisi recenti suggeriscono effetti piccoli e incerti.
Umore	Alcune meta-analisi sui dipeptidi istidinici riportano segnali; eterogeneità elevata.
Neurodegenerazione	Razionale preclinico interessante; nessuna indicazione terapeutica consolidata.

11. Apparato cardiovascolare

Cuore e vasi sono esposti a stress ossidativo, carbonilico e infiammatorio. In modelli sperimentali la carnosina può neutralizzare aldeidi reattive generate dalla perossidazione lipidica e attenuare il danno da ischemia-riperfusione. Questi risultati hanno alimentato l'interesse per un possibile ruolo cardioprotettivo.

Nell'uomo, tuttavia, la letteratura clinica è più limitata rispetto a quella sul muscolo. Non esiste una dose di carnosina validata per prevenzione cardiovascolare e non è corretto sostituirla a controllo pressorio, gestione lipidica, attività fisica, cessazione del fumo e terapie indicate.

La sua posizione più ragionevole è quindi quella di molecola di interesse metabolico, potenzialmente utile all'interno di strategie che riducano glicazione e stress carbonilico, ma con un grado di evidenza clinica ancora inferiore rispetto agli interventi cardiovascolari consolidati.

12. Occhio, mucosa gastrica e derivati clinicamente distinti

La carnosina viene spesso associata a prodotti destinati all'occhio e allo stomaco, ma è essenziale distinguere le diverse molecole. La N-acetilcarnosina è un derivato acetilato impiegato in alcuni colliri e non va automaticamente equiparato alla carnosina orale. Le affermazioni relative alla cataratta richiedono particolare prudenza: i dati clinici sono stati discussi per qualità metodologica e non consentono conclusioni universali.

Lo zinco-L-carnosina, noto anche come polaprezinc, merita una trattazione distinta perché il suo comportamento non coincide con quello della L-carnosina libera. Il complesso possiede affinità per la mucosa danneggiata e può rilasciare localmente zinco, sostenendo stabilità di membrana, difese antiossidanti e processi riparativi. La letteratura clinica riguarda soprattutto ulcera peptica, danno della mucosa gastrointestinale e mucosite orale; una meta-analisi del 2026 sulla mucosa orale ha rilevato segnali favorevoli, ma con certezza delle evidenze da bassa a molto bassa per diversi esiti.

Lo zinco-L-carnosina è invece un complesso di zinco e carnosina utilizzato soprattutto in ambito gastrointestinale. Il suo comportamento farmacologico e le evidenze sulla protezione della mucosa gastrica non possono essere attribuiti alla sola carnosina. Nella pratica, parlare genericamente di "carnosina per lo stomaco" senza specificare il composto porta a confusione.

La distinzione riguarda anche la sicurezza: una formulazione contenente zinco richiede di considerare l'apporto totale del minerale, la durata d'uso e le possibili interferenze con rame e altri micronutrienti.

Composto	Che cosa rappresenta	Nota
L-carnosina	Dipeptide β-alanil-L-istidina	Oggetto principale di questa guida.
N-acetilcarnosina	Derivato acetilato	Soprattutto formulazioni oftalmiche; evidenze da valutare separatamente.
Zinco-L-carnosina	Complesso coordinato con zinco	Impiego gastrointestinale; non equivale a carnosina libera.
Anserina	Dipeptide metilato contenente istidina	Più resistente alla degradazione in alcune condizioni; studiata spesso con carnosina.

13. Alimentazione e stato di carnosina

La carnosina alimentare è presente soprattutto in carne, pollame e pesce. Le fonti vegetali ne contengono quantità trascurabili, anche se forniscono gli amminoacidi necessari alla sintesi endogena. Per questo vegetariani e vegani tendono ad avere concentrazioni muscolari di carnosina inferiori rispetto agli onnivori.

La cottura e la lavorazione possono modificare il contenuto di dipeptidi istidinici, mentre digestione e carnosinasi influenzano la quota che raggiunge il circolo in forma intatta. Il contenuto muscolare non riflette semplicemente la quantità di carnosina ingerita, perché la sintesi endogena e la disponibilità di β-alanina hanno un ruolo centrale.

Una dieta con apporto proteico adeguato, distribuito in modo coerente con età e attività fisica, resta prioritaria. Nei soggetti che escludono gli alimenti animali, la β-alanina rappresenta la strategia più diretta quando l'obiettivo specifico è aumentare la carnosina muscolare.

14. Supplementazione con carnosina

La supplementazione diretta con L-carnosina è biologicamente diversa da quella con β-alanina. Dopo l'ingestione, una quota di carnosina viene assorbita, ma la carnosinasi 1 (CN1) plasmatica può idrolizzarla rapidamente; di conseguenza, l'esposizione sistemica alla molecola intatta tende a essere breve.


Gli studi clinici hanno utilizzato dosi variabili, spesso nell'ordine di centinaia di milligrammi fino a circa 1-2 g al giorno, a seconda dell'ambito. In diversi studi cognitivi la carnosina è stata associata all'anserina, mentre negli studi metabolici sono stati valutati protocolli differenti. Non esiste quindi una singola "dose efficace" valida per tutte le finalità.

Quando l'obiettivo è la carnosina muscolare, la β-alanina ha una base più solida perché bypassa il problema della degradazione del dipeptide e aumenta il substrato limitante per la sintesi intracellulare. La carnosina orale può invece essere studiata per obiettivi sistemici o locali, ma l'interpretazione dei risultati deve tenere conto della farmacocinetica.

Farmacocinetica umana. Uno studio dose-escalation del 2025 su volontari sani ha mostrato che, dopo assunzione orale, la carnosina raggiunge in genere il picco plasmatico entro la prima ora e diventa scarsamente rilevabile oltre circa 4 ore. Dopo una singola dose sperimentale di 10 g è stato osservato anche un aumento transitorio della concentrazione cerebrale misurata con spettroscopia di risonanza magnetica, seguito da un ritorno verso il basale entro circa 5 ore. La variabilità fra individui era marcata. Le dosi elevate utilizzate nello studio servivano a descrivere farmacocinetica e tollerabilità e non rappresentano dosaggi consigliati per l'uso quotidiano.

Il dato chiarisce un punto pratico: l'esposizione sistemica alla carnosina intatta è breve e variabile. L'attività della carnosinasi plasmatica condiziona quindi sia la farmacocinetica sia la possibilità di trasferire direttamente all'uomo i risultati ottenuti in vitro o nei modelli animali.

Carnosina orale: assorbimento, degradazione e destino



Studio umano 2025: picco plasmatico entro circa 1 ora; poca carnosina circolante rilevabile oltre 4 ore.
›la dose da 10 g ha aumentato transitoriamente la carnosina cerebrale a 1 ora, con ritorno verso il basale en

Forma / strategia	Obiettivo principale	Biodisponibilità e nota pratica	Dose studiata / contesto	Livello delle evidenze
L-carnosina	Esposizione sistemica; stress carbonilico/metabolico	Assorbita ma rapidamente condizionata da CN1; marcata variabilità interindividuale	2 g/die per 14 settimane in trial metabolici; dosi acute maggiori in studi PK	Emergente
β-alanina	Aumentare la carnosina muscolare	Bypassa il limite della carnosinasi perché stimola la sintesi intramuscolare	Spesso 3,2-6,4 g/die, frazionata, per ≥4 settimane	Solida per aumento della carnosina muscolare
Anserina + carnosina	Area cognitiva / healthy aging	Dipeptidi correlati; anserina presenta maggiore stabilità in alcune condizioni	Spesso ~1 g/die complessivo per 12 settimane negli studi cognitivi	Bassa-moderata, eterogenea
N-acetilcarnosina	Uso oftalmico	Derivato distinto dalla carnosina libera; evidenze specifiche	Formulazioni topiche studiate	Limitata / specifica
Zinco-L-carnosina	Protezione e riparazione mucosale	Complesso coordinato con zinco; azione soprattutto locale sulla mucosa	Regimi dipendenti dalla formulazione e dall'indicazione	Clinica in specifici contesti gastrointestinali; non equivalente a L-carnosina

Obiettivo	Strategia più coerente	Evidenza
Aumentare carnosina muscolare	β-alanina cronica	Alta per incremento tissutale.
Prestazioni ad alta intensità	β-alanina in contesti selezionati	Moderata; dipende dal tipo di prova.
Metabolismo glucidico	Carnosina o β-alanina studiate	Promettente ma non conclusiva.
Cognizione nell'anziano	Spesso anserina + carnosina	Segnali positivi con bassa certezza complessiva.
Antiglicazione sistemica	Carnosina/derivati in studio	Razionale forte, traduzione clinica ancora incompleta.

15. β-alanina: strategia per aumentare la carnosina muscolare

La β-alanina è un β-amminoacido non essenziale che costituisce il precursore limitante della sintesi muscolare di carnosina. La supplementazione cronica aumenta in modo consistente la concentrazione intramuscolare, con incrementi che dipendono dalla dose totale cumulativa e dalla durata.

Nei protocolli sportivi sono comuni apporti giornalieri complessivi di circa 3,2-6,4 g, suddivisi in più dosi per diverse settimane. La parestesia, cioè formicolio cutaneo transitorio, è l'effetto indesiderato più caratteristico delle dosi singole elevate. Dosi più piccole e formulazioni a rilascio prolungato riducono questo fenomeno senza richiedere necessariamente un cambiamento della dose totale giornaliera.

Il timing rispetto all'allenamento è meno importante della continuità dell'assunzione, perché l'obiettivo è aumentare un deposito muscolare nell'arco di settimane. Per la stessa ragione, la β-alanina non funziona come uno stimolante assunto immediatamente prima dell'esercizio.

Parametro	Indicazione pratica
Dose giornaliera studiata	Spesso 3,2-6,4 g/die in ambito sportivo.
Modalità	Suddivisione in dosi più piccole; possibile uso di rilascio prolungato.
Durata	Tipicamente almeno 4 settimane; l'accumulo continua con esposizione più lunga.
Effetto indesiderato tipico	Parestesia transitoria, dose-dipendente.
Timing	Conta meno della dose cumulativa e dell'aderenza.
Obiettivo	Aumento della carnosina muscolare, non incremento acuto della performance.

16. Anserina, omocarnosina e altri dipeptidi istidinici

La carnosina appartiene a una famiglia di dipeptidi contenenti istidina. L'anserina è una forma metilata, abbondante in alcuni alimenti animali, in particolare carni avicole e pesce. La metilazione modifica la suscettibilità alle dipeptidasi e può aumentare la persistenza relativa rispetto alla carnosina in determinati contesti.

L'omocarnosina, costituita da acido γ-aminobutirrico (GABA, gamma-aminobutyric acid) e istidina, è particolarmente rilevante nel sistema nervoso. Non è intercambiabile con la carnosina e possiede metabolismo e distribuzione differenti.

Negli studi clinici sulla cognizione dell'anziano, anserina e carnosina sono state spesso somministrate insieme, frequentemente in rapporto 3:1. Gli eventuali benefici non possono pertanto essere attribuiti con certezza alla sola carnosina, un aspetto da tenere presente sia nella lettura delle etichette sia nell'interpretazione della letteratura.

17. Sinergie e associazioni

Le associazioni più razionali dipendono dall'obiettivo. Per aumentare la carnosina muscolare, la sinergia fondamentale è fra β-alanina e disponibilità di istidina attraverso un'alimentazione proteicamente adeguata. Nella maggior parte delle persone non è necessario supplementare istidina soltanto per favorire la sintesi di carnosina.

Nel contesto sportivo, β-alanina e creatina agiscono su meccanismi differenti: la prima aumenta la capacità tampone tramite carnosina, la seconda sostiene il sistema fosfocreatina e la rapida risintesi di adenosina trifosfato. L'associazione è quindi biochimicamente complementare, ma il vantaggio combinato dipende dal tipo di prestazione.

Per l'healthy aging, associazioni con coenzima Q10 (CoQ10), pirrolochinolina chinone (PQQ), spermidina, omega-3 o altri interventi mitocondriali sono concettualmente interessanti, ma non esiste una prova clinica robusta che dimostri una sinergia specifica della carnosina con ciascuna di queste sostanze. È preferibile parlare di complementarità di bersagli, non di sinergia dimostrata.

Nel controllo dello stress glicativo e carbonilico, l'effetto della carnosina acquista senso soprattutto insieme a controllo glicemico, riduzione dell'eccesso calorico, attività fisica e adeguato apporto di micronutrienti. L'ambiente metabolico determina la quantità di carbonili prodotti; un scavenger non può compensare indefinitamente un flusso metabolico sfavorevole.

Associazione	Razionale	Forza dell'idea
β-alanina + dieta proteica adeguata	Substrati per la sintesi endogena	Solida.
β-alanina + creatina	Buffering + sistema fosfageno	Complementare; effetto combinato dipende dalla prestazione.
Carnosina + anserina	Dipeptidi con diversa stabilità	Usata in studi clinici cognitivi.
Carnosina + PQQ/CoQ10/spermidina	Bersagli diversi dell'omeostasi cellulare	Plausibile, ma sinergia clinica specifica non dimostrata.
Carnosina + controllo glicemico	Riduzione della produzione + gestione dei carbonili	Concettualmente forte nel terreno metabolico.

18. Carnosina nella medicina del terreno e integrata

La medicina del terreno considera la molecola nel sistema biologico che la produce, la utilizza e la degrada. La carnosina è un esempio particolarmente adatto a questo approccio perché il suo significato cambia in funzione di muscolo, dieta, glicemia, attività fisica, età e carnosinasi.

Un programma personalizzato può quindi partire da composizione corporea e massa muscolare, qualità dell'alimentazione, livello di attività, stato glicemico, stress ossidativo, qualità del sonno e terapie in corso. Solo dopo questa lettura ha senso stabilire se l'obiettivo sia aumentare la carnosina muscolare, modulare lo stress carbonilico o esplorare un impiego complementare in ambiti ancora sperimentali.

In medicina integrata, la supplementazione non è contrapposta alla terapia farmacologica. Nei pazienti con diabete, malattia renale, disturbi neurologici o cardiovascolari, il punto di partenza resta la gestione clinica appropriata; un eventuale uso della carnosina deve essere inserito senza interferire con diagnosi, monitoraggio e trattamento.

Una lettura per obiettivi

Terreno / obiettivo	Priorità di base	Possibile ruolo della carnosina
Sport ad alta intensità	Allenamento, carboidrati, recupero, creatina quando indicata	β-alanina per aumentare carnosina muscolare.
Healthy aging	Forza, massa muscolare, sonno, dieta, controllo metabolico	Supporto sperimentale su carbonili e cognizione, senza sostituire i determinanti principali.
Prediabete / T2DM	Peso, attività, dieta, farmaci quando indicati	Segnale clinico emergente, da considerare complementare.
Dieta vegetale	Proteine adeguate, B12 e micronutrienti critici	β-alanina può compensare il minor pool muscolare di carnosina.
Stress carbonilico	Ridurre iperglicemia, eccesso energetico e fumo	Razionale anticarbonilico; evidenza clinica ancora in sviluppo.

19. Sicurezza, tollerabilità e interazioni

La L-carnosina è generalmente ben tollerata alle dosi utilizzate negli studi di breve e media durata, ma i dati di sicurezza a lungo termine e ad alte dosi sono meno estesi. La β-alanina ha un profilo noto soprattutto per la parestesia transitoria, che non rappresenta in genere una reazione allergica o una neurotossicità.

Le interazioni farmacologiche specifiche della carnosina non sono ben caratterizzate, ma l'assenza di dati non equivale all'assenza di interazioni. Nei soggetti con malattie croniche o politerapia occorre considerare il quadro complessivo, soprattutto quando si utilizzano derivati come lo zinco-L-carnosina, che apportano micronutrienti farmacologicamente attivi.

Gravidanza, allattamento, età pediatrica e insufficienza renale avanzata richiedono particolare cautela per assenza di dati sufficienti o per la complessità del metabolismo. Anche negli sportivi, prodotti combinati devono essere valutati considerando purezza, certificazioni e presenza di ingredienti non dichiarati.

Situazione	Attenzione
β-alanina in dose singola elevata	Parestesia; preferire frazionamento o rilascio prolungato.
Malattia renale cronica	Valutazione clinica individuale.
Zinco-L-carnosina	Considerare l'apporto totale di zinco e l'equilibrio con rame.
Gravidanza/allattamento	Dati insufficienti per raccomandazioni generali.
Politerapia	Verificare indicazioni e monitoraggio con il curante.
Sport agonistico	Preferire prodotti certificati per contaminanti e sostanze proibite.

20. Cosa sappiamo davvero: limiti delle evidenze

La letteratura sulla carnosina è sbilanciata: i meccanismi biochimici e i dati preclinici sono numerosi, mentre gli studi clinici restano più piccoli e spesso eterogenei. Ne deriva un rischio concreto di attribuire a risultati cellulari un significato terapeutico che non è stato ancora dimostrato nell'uomo.

Un secondo limite è la varietà degli interventi. Alcuni studi impiegano carnosina, altri β-alanina, altri ancora anserina/carnosina o derivati come zinco-L-carnosina. Questi interventi non sono intercambiabili e non dovrebbero essere combinati in un'unica conclusione senza considerare la diversa farmacologia.

Un terzo limite è la durata. Molti trial hanno follow-up di settimane o pochi mesi. Per gli obiettivi di healthy aging, neuroprotezione o prevenzione delle complicanze metaboliche servirebbero studi più lunghi, con esiti clinicamente rilevanti e campioni numerosi.

Nel linguaggio dell'healthy aging è utile separare quattro piani: protezione dalle specie carboniliche, controllo della glicazione, funzione mitocondriale e mantenimento della funzione muscolare. La carnosina interagisce plausibilmente con tutti questi domini, ma non esistono ancora prove cliniche sufficienti per definirla un intervento geroprotettivo capace di rallentare l'invecchiamento umano. Le revisioni recenti sottolineano proprio il divario fra ampiezza dei meccanismi preclinici e limitata verifica clinica a lungo termine.

La lettura più equilibrata è quindi doppia: la carnosina è una molecola fisiologicamente importante e meritevole di studio; allo stesso tempo, molte applicazioni commerciali vanno oltre ciò che l'evidenza clinica attuale consente di affermare.

21. Schema pratico di orientamento

Domanda	Risposta sintetica
Voglio aumentare la carnosina muscolare.	La β-alanina è la strategia con evidenza più diretta.
Voglio migliorare una prestazione ad alta intensità.	Può essere utile se la prova è compatibile con il ruolo del buffering; non è universale.
Voglio un effetto antiglicazione.	Il razionale è forte, ma la prova clinica sistemica è ancora incompleta.
Posso usare carnosina al posto della β-alanina per il muscolo?	Non sono equivalenti: la carnosinasi limita la persistenza della carnosina orale.
Anserina e carnosina sono la stessa cosa?	No. Sono dipeptidi correlati con diversa struttura e stabilità.
Carnosina e carnitina sono la stessa cosa?	No. Hanno struttura e funzioni completamente differenti.
È una terapia per diabete o neurodegenerazione?	No. Esistono segnali di ricerca, ma non un'indicazione terapeutica consolidata.
Serve prenderla immediatamente prima dell'allenamento?	Per la β-alanina conta soprattutto l'accumulo cronico, non il timing acuto.

Conclusioni

La carnosina occupa una posizione particolare nella fisiologia umana. Nel muscolo scheletrico rappresenta un sistema di buffering rilevante e la sua concentrazione può essere aumentata in modo prevedibile con β-alanina. Sul piano biochimico, la capacità di interagire con specie carboniliche reattive offre un ponte fra metabolismo, glicazione, lipossidazione e invecchiamento cellulare.

L'ampiezza dei meccanismi descritti richiede rigore nell'interpretazione. Il ruolo muscolare è il più documentato; le applicazioni metaboliche, renali e cognitive sono interessanti ma ancora in fase di consolidamento, mentre molte ipotesi anti-aging derivano soprattutto da modelli preclinici. Tenere distinti questi livelli evita di attribuire alla carnosina effetti più certi di quanto consentano i dati disponibili.

Nella medicina del terreno e nella medicina integrata, la carnosina acquisisce significato quando viene inserita nel contesto: massa muscolare, attività fisica, alimentazione, stato glicemico, qualità del sonno, stress ossidativo e terapie. È questa integrazione, più della singola molecola, a determinare la coerenza biologica dell'intervento.

Glossario

4-HNE: 4-idrossinonenale, aldeide reattiva prodotta dalla perossidazione lipidica.

AGE: Advanced glycation end-products, prodotti finali di glicazione avanzata.

ALE: Advanced lipoxidation end-products, prodotti finali di lipossidazione avanzata.

Anserina: Dipeptide istidinico metilato, strutturalmente correlato alla carnosina.

ATP: Adenosina trifosfato, principale molecola di trasferimento energetico cellulare.

β-alanina: β-amminoacido che rappresenta il precursore generalmente limitante della sintesi di carnosina nel muscolo.

CARNS1: Carnosina sintasi 1, enzima che catalizza la sintesi della carnosina.

CN1: Carnosinasi 1, dipeptidasi secretoria/plasmatica codificata da CNDP1.

CN2: Carnosinasi 2, dipeptidasi citosolica associata a CNDP2.

Carnosina: Dipeptide β-alanil-L-istidina.

GABA: Acido γ-aminobutirrico, principale neurotrasmettitore inibitorio del sistema nervoso centrale.

HbA1c: Emoglobina glicata, biomarcatore dell'esposizione glicemica media dei mesi precedenti.

Nrf2: Fattore di trascrizione che regola geni della risposta antiossidante ed elettrofila.

Omocarnosina: Dipeptide formato da GABA e istidina, particolarmente presente nel sistema nervoso.

Parestesia: Sensazione transitoria di formicolio, frequente con dosi singole elevate di β-alanina.

pKa: Valore di pH al quale una specie acido-base è per metà protonata e per metà deprotonata.

ROS: Reactive oxygen species, specie reattive dell'ossigeno.

Scavenging: Intercettazione chimica di una specie reattiva prima che modifichi bersagli biologici.

Zinco-L-carnosina: Complesso coordinato di zinco e carnosina, farmacologicamente distinto dalla carnosina libera.

CNDP1: gene che codifica la carnosinasi 1 (CN1), dipeptidasi secretoria/plasmatica.

CNDP2: gene associato alla carnosinasi 2 (CN2), dipeptidasi prevalentemente citosolica.

CoQ10: coenzima Q10, chinone liposolubile della catena respiratoria mitocondriale e sistema redox cellulare.

Metilgliossale: dicarbonile reattivo prodotto soprattutto come sottoprodotto del metabolismo glicolitico e importante precursore di AGE.

N-acetilcarnosina: derivato acetilato della carnosina studiato soprattutto in formulazioni oftalmiche; non è equivalente alla L-carnosina orale.

PQQ: pirrolochinolina chinone, composto redox bioattivo studiato per possibili effetti sulla funzione mitocondriale.

RCT: Randomized controlled trial, studio randomizzato controllato.

Bibliografia

Dolan E, Saunders B, Harris RC et al. Comparative physiology and pharmacology of carnosine and β-alanine. Nutrients. 2019;11:552.

Kendrick IP, Kim HJ, Harris RC et al. The effect of 4 weeks β-alanine supplementation and isokinetic training on carnosine concentrations in type I and II human skeletal muscle fibres. Eur J Appl Physiol. 2009;106:131-138.

Saunders B, Elliott-Sale K, Artioli GG et al. β-alanine supplementation to improve exercise capacity and performance: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51:658-669.

Bueno de Camargo JB, Brigatto FA. Beta-Alanine for Improving Exercise Capacity, Muscle Strength, and Functional Performance of Older Adults: A Systematic Review. J Aging Phys Act. 2024; published online 26 Dec 2024. PMID 39724872.

Nelson et al. Effect of Beta-Alanine Supplementation on Maximal Intensity Exercise in Trained Young Male Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2024. PMID 39032921.

Boldyrev AA, Aldini G, Derave W. Physiology and pathophysiology of carnosine. Physiol Rev. 2013;93:1803-1845.

Aldini G, Facino RM, Beretta G, Carini M. Carnosine and related dipeptides as quenchers of reactive carbonyl species. BioFactors. 2005;24:77-87.

Carini M, Aldini G, Beretta G et al. Acrolein-sequestering ability of endogenous dipeptides: characterization of carnosine and homocarnosine-acrolein adducts by electrospray ionization tandem mass spectrometry. J Mass Spectrom. 2003;38:996-1006.

Understanding the antioxidant and carbonyl sequestering activity of carnosine: direct and indirect mechanisms. Molecules. 2020. PMID 33302741.

Bellia F, Vecchio G, Cuzzocrea S et al. Carnosine and its derivatives as modulators of cellular redox homeostasis. Antioxidants. Review literature.

Carnosine and Beta-Alanine Supplementation in Human Medicine: Narrative Review and Critical Assessment. Nutrients. 2023;15:1770. PMID 37049610.

Carnosine and Diabetic Nephropathy. Curr Med Chem. 2019. PMID 30914013.

Effect of carnosine or beta-alanine supplementation therapy for prediabetes or type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. 2025. PMID 40999397.

Hisatsune T, Kaneko J, Kurashige H et al. Effect of Anserine/Carnosine Supplementation on Verbal Episodic Memory in Elderly People. J Alzheimers Dis. 2016;50:149-159. PMID 26682691.

Daily Carnosine and Anserine Supplementation Alters Verbal Episodic Memory and Resting State Network Connectivity in Healthy Elderly Adults. Front Aging Neurosci. 2015. PMID 26640437.

Effects of Anserine/Carnosine Supplementation on Mild Cognitive Impairment with APOE4. Nutrients. 2019. PMID 31319510.

The Therapeutic Potential of Carnosine/Anserine Supplementation against Cognitive Decline: A Systematic Review with Meta-Analysis. Biomedicines. 2021. PMID 33806459.

Bell SM, Hariharan R, Laud PJ et al. Histidine-containing dipeptide supplementation improves delayed recall: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2024;82. PMID 38013229.

The Effects of Carnosine on Cognitive Function and Mental Health - A Systematic Review and Meta-Analysis. 2026. PMID 42123986.

Carnosine/histidine-containing dipeptide supplementation improves depression and quality of life: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Rev. 2024. PMID 38545720.

Ali AN, Su L, Newton J et al. Dietary Carnosine Supplementation in Healthy Human Volunteers: A Safety, Tolerability, Plasma and Brain Concentration Study. Nutrients. 2025;17(13):2130. PMID 40647235.

de Courten B et al. Carnosine supplementation improves glucose control in adults with pre-diabetes and type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2024. PMID 38172006.

Saadati S et al. Carnosine Did Not Affect Vascular and Metabolic Outcomes in Patients with Prediabetes and Type 2 Diabetes: A 14-Week Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2023;15:4835. PMID 38004228.

Kumar A, Suryakumar G, Singh SN, Rathor R. A comprehensive review on physiological and biological activities of carnosine: turning from preclinical facts to potential clinical applications. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2025;398:1341-1366. PMID 39302423.

Efthymakis K, Neri M. The role of Zinc L-Carnosine in the prevention and treatment of gastrointestinal mucosal disease in humans: a review. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2022;46:101954. PMID 35659631.

De Francesco P et al. Protective and Healing Effects of Zinc L-Carnosine on the Oral Mucosa: A Systematic Review and Meta-Analysis. Dent J. 2026;14:408. PMID 42505716.

The Effects of Carnosine on Cognitive Function and Mental Health—A Systematic Review and Meta-Analysis. 2026. PMID 42123986.

L'Autore



Giovanni Chetta

Biochimico, fisiologo e biofisico, con una formazione multidisciplinare nelle scienze biomediche e numerosi percorsi di alta specializzazione nell'ambito della fisiologia, nutrizione, nutraceutica, fitoterapia, biomeccanica.

L'intero percorso professionale si è sviluppato in ambito medico, in costante collaborazione con medici specialisti e altri professionisti sanitari. Questa esperienza gli ha consentito di coniugare il rigore delle scienze di base con le esigenze della pratica clinica, sviluppando una visione integrata dei meccanismi fisiologici e fisiopatologici che regolano l'organismo umano.

Dal 1988 si dedica allo studio del metabolismo, dell'infiammazione cronica, della bioenergetica cellulare e delle interazioni tra i sistemi che mantengono l'omeostasi.

La sua attività è orientata a integrare le conoscenze della fisiologia classica con le più recenti evidenze della ricerca scientifica, promuovendo un approccio che considera la terapia farmacologica e gli interventi sul terreno biologico come strumenti complementari di un'unica strategia terapeutica.

«Biochimica, fisiologia e biofisica compongono il linguaggio della medicina: comprenderne i meccanismi aumenta la consapevolezza riguardo salute, malattia e cura.»

giovannichetta.com

Copyright e note legali

Versione 1.0 – 2026

© 2026 Giovanni Chetta. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente documento senza preventiva autorizzazione scritta dell'Autore, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.

Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente divulgative ed educative e non sostituiscono il parere del medico o di altri professionisti sanitari qualificati. Ogni decisione diagnostica o terapeutica deve essere presa nell’ambito di una valutazione clinica individuale.

Questa guida potrà essere periodicamente aggiornata alla luce delle nuove evidenze scientifiche. La versione riportata in copertina o frontespizio e/o in questa pagina identifica il testo di riferimento.